

# URINEONDERZOEK BIJ MIDDELENGEBRUIK

Rob van Vredendaal

Verpleegkundig Specialist GGZ


Masterclass NVP Psychose en Verslaving

November – 2020

# DISCLOSURE


- Er is geen sprake van (potentiële)belangenverstrengeling
- 

# INHOUD

- ▮ Correlatie middelengebruik & psychose
  - ▮ Behandeling psychose & verslaving
  - ▮ Onderzoek Verslavingszorg Noord Nederland
  - ▮ Discussie
- 

# STELLING

“Urineonderzoek bij patiënten met een psychose leidt tot een toename van angst en achterdocht en verstoring van de behandelrelatie”




# CORRELATIE MIDDELENGEBRUIK & PSYCHOSE

- Middelengebruik – eerste psychose

50% van de patiënten (N=404) voldeed aan de criteria voor een langdurig afhankelijkheid van middelen.

*(Brunette et al., 2018)*



# CORRELATIE MIDDELENGEBRUIK & PSYCHOSE

- Verschillende studies versterken de hypothese dat de genetische determinanten van het risico op schizofrenie patiënten kwetsbaar maken voor middelengebruik.
- Deze kwetsbaarheid zou bij verhoogd middelengebruik zowel het risico op het ontwikkelen van een verslaving vergroten, als een extra risicofactor zijn voor het ontstaan van psychotische symptomen.

*(Khokhar, Dwiell, Henricks, Doucette, & Green, 2017)*

# BEHANDELING PSYCHOSE & VERSLAVING

- Bij patiënten met een stoornis in het middelengebruik en eerste psychose worden de beste resultaten bereikt als tijdens opname een geïntegreerde behandeling plaatsvindt van antipsychotica gecombineerd met op verslaving gebaseerde psychosociale interventies. *(Crockford, & Addington, 2017)*
- Patiënten met een verslaving en psychotische klachten hebben naast ernstigere symptomen te maken met een grotere mate van stigmatisering. *(Brunette et al., 2018)*

# ONDERZOEK VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

- In de verslavingszorg worden urineonderzoek en zelfrapportage ingezet tijdens de behandeling.
- Het is onduidelijk welke ervaringen patiënten hierbij hebben en welke invloed deze ervaringen hebben op stigmabestrijding in het kader van herstelondersteunende zorg.





# DOEL



- Inzicht krijgen in de ervaringen van patiënten bij de inzet van urineonderzoek en zelfrapportage.
- Interventies inzetten op een wijze die het meest aansluit bij de herstelondersteunende zorg aan patiënten.



# ONDERZOEKSMETHODE

- Kwalitatief fenomenologisch onderzoek gericht op het patiënten perspectief, waarbij diepte-interviews zijn geanalyseerd met het model van Colaizzi.
- De onderzoekspopulatie zijn patiënten van de beschermde woonvormen van Verslavingszorg Noord Nederland Friesland.




# PARTICIPANTEN

	Leeftijd categorie	Middel	Fase van behandeling	Duur van verblijf in BW
1	50-60	Alcohol	2	7 maanden
2	30-40	Harddrugs	1	3 maanden
3	18-30	Alcohol	1	5 maanden
4	18-30	Harddrugs	2	6 maanden
5	30-40	Harddrugs & alcohol	3	14 maanden
6	30-40	Harddrugs	1	4 maanden
7	60-70	Alcohol	3	12 maanden
8	18-30	Harddrugs	1	4 maanden
9	40-50	Harddrugs & alcohol	2	10 maanden
10	50-60	Harddrugs	2	9 maanden
11	50-60	Harddrugs & alcohol	3	16 maanden
12	18-30	Soft- & harddrugs	3	13 maanden

# RESULTATEN

Gebaseerd op de ervaringen van patiënten (N=12) zijn vier thema's gevonden:

- Zelfbeeld
  - Zelfinzicht
  - Behandelrelatie
  - Autonomie
- 
- A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

# CONCLUSIE

- Urineonderzoek, gevolgd door zelfrapportage leidt tot verbetering van het zelfbeeld en zelfinzicht, omdat de patiënt kan aantonen eerlijk te zijn waardoor het zelfvertrouwen en vertrouwen van belangrijke anderen toeneemt.
- Belangrijke voorwaarden zijn een betrokken en laagdrempelige behandelrelatie en autonomie over de inzet van urineonderzoek en zelfrapportage.
- Urineonderzoek en zelfrapportage hebben een destigmatiserend effect wat leidt tot empowerment.



# DISCUSSIE

“Urineonderzoek bij patiënten met een psychose leidt tot een toename van angst en achterdocht en verstoring van de behandelrelatie”

